




VEKTOR

MATA KULIAH: MATRIKS DAN RUANG VEKTOR

PERTEMUAN: 2



MATERI

- Panjang Vektor
- Dot Product
- Cross Product
- Kombinasi Linier
- Bebas dan Bergantung Linier

TUJUAN

Mahasiswa dapat memahami panjang vektor dalam berbagai ruang, dot product, cross product, kombinasi linier, serta vektor yang bebas dan bergantung linier.

PANJANG VEKTOR

- **Panjang Vektor** disebut juga dengan Norm atau Magnitude.
- Jika diketahui vektor $v \in \mathbb{R}^n$ dimana $v=(v_1,v_2,\dots,v_n)$ maka panjang vektor dari v adalah:


$$|v| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

Contoh. Diketahui $u = (4,-1)$, $v = (0, 5,1)$, dan $w = (-3,-3,2,1)$ dimana $u \in \mathbb{R}^2$, $v \in \mathbb{R}^3$, dan $w \in \mathbb{R}^4$. Panjang masing-masing vektor adalah:

$$|u| = \sqrt{4^2 + (-1)^2} = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}$$

$$|v| = \sqrt{0^2 + 5^2 + 1^2} = \sqrt{0+25+1} = \sqrt{26}$$

$$|w| = \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{9+9+4+1} = \sqrt{23}$$



Hitung panjang masing-masing vektor di atas.

PANJANG VEKTOR

- **Panjang Vektor** disebut juga dengan Norm atau Magnitude.
- Jika diketahui vektor $v \in \mathbb{R}^n$ dimana $v=(v_1, v_2, \dots, v_n)$ maka panjang vektor dari v adalah:

$$|v| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

Contoh. Diketahui $u = (4, -1)$, $v = (0, 5, 1)$, dan $w = (-3, -3, 2, 1)$ dimana $u \in \mathbb{R}^2$, $v \in \mathbb{R}^3$, dan $w \in \mathbb{R}^4$. Panjang masing-masing vektor adalah:

$$|u| = \sqrt{4^2 + (-1)^2} = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}$$

$$|v| = \sqrt{0^2 + 5^2 + 1^2} = \sqrt{0+25+1} = \sqrt{26}$$


$$|w| = \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{9+9+4+1} = \sqrt{23}$$

Contoh. Diketahui $u = 3i+4j$ dan $v = -i+2j-3k$, dimana $u \in \mathbb{R}^2$, dan $v \in \mathbb{R}^3$. Panjang masing-masing vektor adalah:

$$|u| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

$$|v| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{1+4+9} = \sqrt{14}$$

Hitung panjang masing-masing vektor di gambar berikut.



$$u = (4-1, 1-5) = (3, -4);$$

$$|u| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

$$v = (0-2, 0-3, 4-0) = (-2, -3, 4);$$


$$|v| = \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{4+9+16} = \sqrt{29}$$

VEKTOR UNIT

- **Vektor unit atau vektor satuan** adalah vektor dengan panjang 1. Vektor unit dari vektor v adalah:


$$\frac{v}{|v|}$$

- Vektor unit standar (disebut juga vektor basis) adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu koordinat.



Vektor Basis di R^2

$i=(1,0)$ dan $j=(0,1)$



Vektor Basis di R^3

$i=(1,0,0)$, $j=(0,1,0)$
dan $k=(0,0,1)$

Contoh. Diketahui $u = (4,-1)$ dan $v = (0, 5,1)$. Tentukan vektor unit w yang searah dengan vektor u dan v .

$$|u| = \sqrt{4^2 + (-1)^2} = \sqrt{17}$$
$$|v| = \sqrt{0^2 + 5^2 + 1^2} = \sqrt{26}$$

- Vektor unit w dari u adalah:

$$w = \frac{u}{|u|} = \frac{(4,-1)}{\sqrt{17}}; |w| = 1$$

- Vektor unit w dari v adalah:

$$w = \frac{v}{|v|} = \frac{(0,5,1)}{\sqrt{26}}; |w| = 1$$

Sembarang vektor v di ruang R^n dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari vektor basis.

Contoh.

$$u=(4,-1)=4i-j$$

$$v=(1,-5,2)=1i+(-5)j+2k=i-5j+2k$$

$$w=(2,1,3,5)=2i+j+3k+5l$$

JARAK ANTAR DUA VEKTOR

Jika diketahui vektor-vektor $u, v \in \mathbb{R}^n$ dimana $u=(u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $v=(v_1, v_2, \dots, v_n)$ maka jarak antara vektor u dan v adalah:

$$\begin{aligned} d(u, v) &= |u - v| \\ &= \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2} \end{aligned}$$

Contoh.

$u = (1, 3)$ and $v = (0, 7)$ maka:

$$\begin{aligned} d(u, v) &= \sqrt{(1-0)^2 + (3-7)^2} \\ &= \sqrt{1+16} \\ &= \sqrt{17} \end{aligned}$$

Contoh.

$u = (1, 3, 7)$ and $v = (0, 7, 2)$ maka:

$$\begin{aligned} d(u, v) &= \sqrt{(1-0)^2 + (3-7)^2 + (7-2)^2} \\ &= \sqrt{1+16+25} \\ &= \sqrt{42} \end{aligned}$$

Contoh.

$u = (1, 3, -2, 7)$ and $v = (0, 7, 2, 2)$ maka:

$$\begin{aligned} d(u, v) &= \sqrt{(1-0)^2 + (3-7)^2 + (-2-2)^2 + (7-2)^2} \\ &= \sqrt{1+16+16+25} \\ &= \sqrt{58} \end{aligned}$$


DOT PRODUCT

- Jika u, v adalah vektor-vektor bukan nol dan θ adalah sudut antara u dan v , maka dot product antara u dan v didefinisikan sebagai:

$$u \bullet v = |u| |v| \cos \theta$$

- Vektor u dan v saling tegak lurus (orthogonal) jika $u \bullet v = 0$
- Dot Product (disebut juga Euclidean Inner Product) biasanya digunakan untuk menganalisis sudut antar vektor.

Contoh. Diketahui vektor $u = (0, 0, 1)$ dan $v = (0, 2, 2)$. Jika sudut antara u dan v adalah 45° , tentukan $u \bullet v$.



$$|u| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

$$|v| = \sqrt{0^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\cos(45) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} u \bullet v &= |u| |v| \cos(\theta) \\ &= (1)(2\sqrt{2})\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= 2 \end{aligned}$$

DOT PRODUCT

Jika diketahui vektor-vektor $u, v \in \mathbb{R}^n$ dimana $u=(u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $v=(v_1, v_2, \dots, v_n)$ maka $u \bullet v$ dapat ditulis sebagai kombinasi linier antar komponen vektor:

$$u \bullet v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

Sifat Operasi

1. $u \bullet v = v \bullet u$
2. $u \bullet (v+w) = u \bullet v + u \bullet w$
3. $k(u \bullet v) = (ku) \bullet v = u \bullet (kv)$
4. $0 \bullet v = v \bullet 0 = 0$

Contoh.

1. Jika $u=(0,0,1)$ dan $v=(0,2,2)$ maka:
 $u \bullet v = (0)(0) + (0)(2) + (1)(2) = 0 + 0 + 2 = 2.$
2. Jika $u=(1,2)$ dan $v=(-3,2)$ maka:
 $u \bullet v = (1)(-3) + (2)(2) = -3 + 4 = 1.$
3. Jika $u=(1,2,-3,2)$ dan $v=(-3,2,1,0)$ maka:
 $u \bullet v = (1)(-3) + (2)(2) + (-3)(1) + (2)(0) = -3 + 4 - 3 + 0 = -2.$
4. Jika $u = 3i+4j$ dan $v = -i+2j$ maka:
 $u \bullet v = (3)(-1) + (4)(2) = -3 + 8 = 5.$
5. Jika $u = 3i+4j-k$ dan $v = -i+2j+2k$ maka:
 $u \bullet v = (3)(-1) + (4)(2) + (-1)(2) = -3 + 8 - 2 = 3.$

DOT PRODUCT

Sudut antara vektor u dan v dapat ditulis sebagai:

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|u||v|}$$
$$= \frac{u \cdot v}{\sqrt{u \cdot u} \sqrt{v \cdot v}}$$

Contoh.

Jika $u=(0,0,1)$ dan $v=(0,2,2)$ maka sudut antara u dan v :

$$u \cdot v = (0)(0) + (0)(2) + (1)(2) = 2$$

$$u \cdot u = (0)(0) + (0)(0) + (1)(1) = 1$$

$$v \cdot v = (0)(0) + (2)(2) + (2)(2) = 8$$

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|u||v|} = \frac{2}{\sqrt{1}\sqrt{8}} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 45^\circ$$

Contoh. Jika $u = 3i+4j$ dan $v = -i+2j$ maka sudut antara u dan v :

$$u \cdot v = (3)(-1) + (4)(2) = -3 + 8 = 5$$

$$u \cdot u = (3)(3) + (4)(4) = 9 + 16 = 25$$

$$v \cdot v = (-1)(-1) + (2)(2) = 1 + 4 = 5$$

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|u||v|} = \frac{5}{\sqrt{25}\sqrt{5}} = \frac{5}{5\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

Contoh. Jika $u = 3i+4j-k$ dan $v = -i+2j+2k$ maka:

$$u \cdot v = (3)(-1) + (4)(2) + (-1)(2) = -3 + 8 - 2 = 3$$

$$u \cdot u = (3)(3) + (4)(4) + (-1)(-1) = 9 + 16 + 1 = 26$$

$$v \cdot v = (-1)(-1) + (2)(2) + (2)(2) = 1 + 4 + 4 = 9$$

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|u||v|} = \frac{3}{\sqrt{26}\sqrt{9}} = \frac{3}{3\sqrt{26}} = \frac{1}{\sqrt{26}}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{26}}\right)$$

CROSS PRODUCT

- Hanya berlaku di $\mathbb{R}^3$.
- Jika diketahui vektor-vektor $u, v \in \mathbb{R}^3$ dimana $u=(u_1, u_2, u_3)$ dan $v=(v_1, v_2, v_3)$ maka $u \times v$ didefinisikan sebagai:

$$u \times v = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

- $u \times v$ menghasilkan vektor. sedangkan $u \bullet v$ menghasilkan skalar.

Contoh.

Tentukan hasil $u \times v$ dan $u \bullet v$, jika $u = (1, 2, -2)$ dan $v = (3, 0, 1)$.

$$\begin{aligned} u \times v &= (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1) \\ &= ((2)(1) - (-2)(0), (-2)(3) - (1)(1), (1)(0) - (2)(3)) \\ &= (2 - 0, -6 - 1, 0 - 6) \\ &= (2, -7, -6) \\ u \bullet v &= (1)(3) + (2)(0) + (-2)(1) \\ &= 3 + 0 - 2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

CROSS PRODUCT

Contoh. Jika $u = 3i + 4j - k$ dan $v = -i + 2j + 2k$ maka:
 $u = (3, 4, -1)$ dan $v = (-1, 2, 2)$. Sehingga

$$\begin{aligned} u \times v &= (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1) \\ &= ((4)(2) - (-1)(2), (-1)(-1) - (3)(2), (3)(2) - (4)(-1)) \\ &= (8 - (-2), 1 - 6, 4 - (-4)) \\ &= (10, -5, 8) \text{ atau} \\ &= 10i - 5j + 8k \\ u \cdot v &= (3)(-1) + (4)(2) + (-1)(2) \\ &= -3 + 8 - 2 \\ &= 3 \end{aligned}$$

Sekali lagi ...

- $u \times v$ menghasilkan vektor
- $u \cdot v$ menghasilkan skalar

RUANG VEKTOR DAN KOMBINASI LINIER

Jika V adalah himpunan tidak kosong berisikan vektor-vektor dan berlaku: (1) operasi penjumlahan dan (2) perkalian vektor dengan skalar, maka V disebut ruang vektor jika diketahui vektor-vektor $u, v, w \in V$ maka operasi-operasi berikut dipenuhi di V :

1. Jika $u, v \in V$ maka $u+v \in V$
2. $u+v=v+u$
3. $(u+v)+w=(u+v)+w$
4. $0+u=u+0=u$
5. $u+(-u)=(-u)+u=0$
6. Untuk skalar k maka $ku \in V$
7. $k(u+v)=ku+kv$
8. $(k+m)u=ku+mu$ untuk skalar m
9. $k(mu)=(km)u$
10. $1u=u$

Vektor w disebut sebagai kombinasi linier dari vektor u dan v jika terdapat skalar k_1 dan k_2 sedemikian sehingga memenuhi:

$$w=k_1u+k_2v$$

Contoh.

Jika $u=(1,2)$ dan $v=(-3,2)$ maka vektor $w=(-1,6)$ adalah kombinasi linier dari u dan v , sebab w dapat dinyatakan sebagai $w=2u+v$.

- $2u+v=2(1,2)+(-3,2)=(2,4)+(-3,2)=(-1,6)$.
- $w=2u+v$ artinya terdapat skalar $k_1=2$ dan $k_2=1$ sedemikian sehingga $w=k_1u+k_2v$.

RUANG VEKTOR, BEBAS DAN BERGANTUNG LINIER

Contoh.

Jika $u=(-1,3)$ dan $v=(2,1)$, selidiki apakah vektor $w=(-4,8)$ adalah kombinasi linier dari u dan v .

Misal w adalah kombinasi linier dari u dan v maka

$$w=k_1u+k_2v$$

$$(-4,8)=k_1(-1,3)+k_2(2,1)$$

$$(-4,8)=(-k_1,3k_1)+(2k_2, k_2)$$

$$(-4,8)=(-k_1+2k_2,3k_1+k_2)$$

$$-k_1+2k_2=-4 \quad -k_1+2k_2=-4$$

$$3k_1+k_2=8 \quad 6k_1+2k_2=16$$

----- -

$$-7k_1 = -20 \text{ atau } k_1=20/7$$

$$k_2=8-3k_1=8-3(20/7)=8-(60/7)=-4/7$$

Berarti w merupakan kombinasi linier dari u dan v , yaitu:

$$w=k_1u+k_2v$$

$$w=(20/7)u - (4/7)v$$

Contoh.

Jika $u=(1,2,-1)$ dan $v=(6,4,2)$, selidiki apakah vektor $w=(9,2,7)$ adalah kombinasi linier dari u dan v .

Misal w adalah kombinasi linier dari u dan v maka $w=k_1u+k_2v$

$$(9,2,7)=k_1(1,2,-1)+k_2(6,4,2)$$

$$(9,2,7)=(k_1,2k_1,-k_1)+(6k_2,4k_2,2k_2)$$

$$(9,2,7)=(k_1+6k_2,2k_1+4k_2,-k_1+2k_2)$$

$$k_1+6k_2=9 \quad (1)$$

$$2k_1+4k_2=2 \quad (2)$$

$$-k_1+2k_2=7 \quad (3)$$

$$k_1+6k_2=9 \quad (1)$$

$$-k_1+2k_2=7 \quad (3)$$

$$----- +$$

$$8k_2=16 \text{ atau } k_2=2$$

$$k_1=9-6k_2$$

$$=9-6(2)$$

$$=-3$$

$$k_1=-3 \text{ dan } k_2=2$$

memenuhi pers. (3)

$$2k_1+4k_2=2$$

$$2(-3)+4(2)=2 \text{ (dipenuhi)}$$

Sehingga $k_1=-3$ dan $k_2=2$ memenuhi semua persamaan dan w merupakan kombinasi linier dari u dan v , yaitu:

$$w=k_1u+k_2v$$

$$w=(-3)u + (2)v \text{ atau}$$

$$w=-3u + 2v$$

RUANG VEKTOR, BEBAS DAN BERGANTUNG LINIER

Contoh.

Jika $u=(1,2,-1)$ dan $v=(6,4,2)$, selidiki apakah vektor $w=(4,-1,8)$ adalah kombinasi linier dari u dan v .

Misal w adalah kombinasi linier dari u dan v maka $w=k_1u+k_2v$

$$(4,-1,8)=k_1(1,2,-1)+k_2(6,4,2)$$

$$(4,-1,8)=(k_1,2k_1,-k_1)+(6k_2,4k_2,2k_2)$$

$$(4,-1,8)=(k_1+6k_2,2k_1+4k_2,-k_1+2k_2)$$

$$k_1+6k_2=4 \quad (1)$$

$$2k_1+4k_2=-1 \quad (2)$$

$$-k_1+2k_2=8 \quad (3)$$

$$k_1+6k_2=4 \quad (1)$$

$$-k_1+2k_2=8 \quad (3)$$

$$\text{-----} + \quad \quad \quad =0$$

$$8k_2=12 \text{ atau } k_2=12/8$$

$$k_1=4-6k_2$$

$$=4-6(12/8)$$

$$=0$$

$$k_1=0 \text{ dan } k_2=12/8$$

tidak memenuhi pers (2)

$$2k_1+4k_2=-1$$

$$2(0)+4(12/8)=6 \neq -1$$

Karena tidak ditemukan k_1 dan k_2 yang memenuhi semua persamaan, maka w bukan merupakan kombinasi linier dari u dan v .

BEBAS DAN BERGANTUNG LINIER

Jika $S=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ adalah himpunan dua atau lebih vektor di ruang vektor V maka S disebut **bebas linier** jika vektor di S tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lain. Sebaliknya, S disebut **bergantung linier** jika vektor di S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lain.

Secara matematis, $S=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ himpunan vektor-vektor tidak kosong di ruang vektor V adalah **bebas linier** jika semua koefisien $k_i=0$ ($i=1,2,\dots,r$) dan memenuhi:

$$k_1v_1+k_2v_2+\dots+k_nv_n=0$$

Jika terdapat koefisien $k_i \neq 0$ maka disebut **bergantung linier**.

Contoh.

Jika $u=(3,1,2)$, $v=(1,2,1)$, dan $w=(2,-1,1) \in \mathbb{R}^3$, selidiki apakah u , v dan w saling bebas linier atau tidak.

$$k_1v_1+k_2v_2+k_3v_3=0$$

$$k_1(3,1,2)+k_2(1,2,1)+k_3(2,-1,1)=(0,0,0)$$

$$(3k_1, k_1, 2k_1)+(k_2, 2k_2, k_2)+(2k_3, -k_3, k_3)=(0,0,0)$$

$$(3k_1+k_2+2k_3, k_1+2k_2-k_3, 2k_1+k_2+k_3)=(0,0,0)$$

$$3k_1+k_2+2k_3=0 \quad (1)$$

$$k_1+2k_2-k_3=0 \quad (2)$$

$$2k_1+k_2+k_3=0 \quad (3)$$

$$3k_1+k_2+2k_3=0 \quad (1)$$

$$2k_1+k_2+k_3=0 \quad (3)$$

$$k_1+k_3=0 \quad (4)$$

$$6k_1+2k_2+4k_3=0 \quad (1)$$

$$k_1+2k_2-k_3=0 \quad (2)$$

$$5k_1+5k_3=0$$

$$k_1+k_3=0 \quad (5)$$

Pers. (4)=(5) diperoleh $k_1=-k_3$

Pers. (2) $k_1+2k_2-k_3=0$ maka $-k_3+2k_2-k_3=0$ atau $2k_2=2k_3$ atau $k_2=k_3$

Jadi diperoleh $k_1=-k_3$ dan $k_2=k_3$ (Banyak nilai)

Misal $k_3=1$ maka $k_1=-1$ dan $k_2=1$

Misal $k_3=2$ maka $k_1=-2$ dan $k_2=2$ dan seterusnya.

Artinya terdapat koefisien $k_i \neq 0$ sehingga u , v , dan w tidak bebas linier atau bergantung linier.

BEBAS DAN BERGANTUNG LINIER

Contoh.

Jika $u=(-3,0,4)$, $v=(5,-1,2)$, dan $w=(1,1,8) \in \mathbb{R}^3$, selidiki apakah u , v dan w saling bebas linier atau tidak.

$$k_1v_1+k_2v_2+k_3v_3=0$$

$$k_1(-3,0,4)+k_2(5,-1,2)+k_3(1,1,8)=(0,0,0)$$

$$(-3k_1,0,4k_1)+(5k_2,-k_2,2k_2)+(k_3,k_3,8k_3)=(0,0,0)$$

$$(-3k_1+5k_2+k_3, -k_2+k_3, 4k_1+2k_2+8k_3)=(0,0,0)$$

$$-3k_1+5k_2+k_3=0 \quad (1)$$

$$-k_2+k_3=0 \quad (2) \quad \rightarrow k_2=k_3 \quad (4)$$

$$4k_1+2k_2+8k_3=0 \quad (3)$$

$$k_2=k_3 \rightarrow (1) -3k_1+5k_3+k_3=0 \text{ atau } -3k_1+6k_3=0 \quad (5)$$

$$\rightarrow (3) 4k_1+2k_3+8k_3=0 \text{ atau } 4k_1+10k_3=0 \quad (6)$$

$$-3k_1+6k_3=0 \quad (5) \text{ atau } -12k_1+24k_3=0$$

$$4k_1+10k_3=0 \quad (6) \quad 12k_1+30k_3=0$$

----- +

$$54k_3=0 \text{ atau } k_3=0$$

Sehingga $k_2=0$ dan $k_1=0$. Jadi $k_1=0; k_2=0; k_3=0$

Artinya u , v dan w saling bebas linier

Contoh.

Jika $u=(2,3)$ dan $v=(1,3) \in \mathbb{R}^2$, selidiki apakah u dan v saling bebas linier atau tidak.

$$k_1v_1+k_2v_2=0$$

$$k_1(2,3)+k_2(1,3)=(0,0)$$

$$(2k_1,3k_1)+(k_2,3k_2)=(0,0)$$

$$(2k_1+k_2, 3k_1+3k_2)=(0,0)$$

$$2k_1+k_2=0 \quad (1) \quad \text{atau} \quad 6k_1+3k_2=0$$

$$3k_1+3k_2=0 \quad (2) \quad 3k_1+3k_2=0$$

----- -

$$3k_1=0 \rightarrow k_1=0$$

$$2k_1+k_2=0 \rightarrow 2(0)+k_2=0 \rightarrow k_2=0$$

Jadi $k_1=0; k_2=0$; Artinya u dan v saling bebas linier